



安徽医科大学学报

Acta Universitatis Medicinalis Anhui

ISSN 1000-1492, CN 34-1065/R

《安徽医科大学学报》网络首发论文

题目：中波紫外线诱导的表皮内质网应激与治疗干预
作者：林博扬，强磊
收稿日期：2025-06-20
网络首发日期：2025-09-12
引用格式：林博扬，强磊. 中波紫外线诱导的表皮内质网应激与治疗干预[J/OL]. 安徽医科大学学报. <https://link.cnki.net/urlid/34.1065.R.20250912.0951.005>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

中波紫外线诱导的表皮内质网应激与治疗干预

林博扬, 强 磊

(中国药科大学基础医学与临床药学学院, 南京 211198)

摘要 内质网是细胞内最重要的膜性细胞器, 对稳定细胞内稳态起关键作用。未折叠或错误折叠蛋白的聚集、细胞内钙离子、氧化还原稳态的改变均能诱发内质网应激 (ERS)。ERS 参与维持皮肤屏障稳态。中波紫外线 (UVB) 是导致皮肤损伤的重要因素, UVB 诱导表皮发生 ERS, 进而调控多种生理病理学过程, 不仅能够参与表皮屏障稳态维持和角质形成细胞分化命运调控的生理过程; 同时还参与 UVB 诱导的皮肤炎症、角质形成细胞凋亡等病理过程。因此, ERS 有望成为 UVB 介导的皮肤相关疾病的治疗靶点。目前, 采用抗氧化剂、核因子 κ B (NF- κ B) 抑制剂和内质网 Ca^{2+} 水平调节剂等药物调控 UVB 诱导的角质形成细胞 ERS 的策略已显示出潜在的临床应用价值。该文章将围绕 UVB 诱导的角质形成细胞 ERS 在皮肤损伤中的作用及靶向 ERS 的药物在 UVB 诱导的皮肤损伤中的研究进展进行综述, 为 ERS 在 UVB 诱导的皮肤损伤中所扮演的角色的研究和以 ERS 作为靶点、对 UVB 诱导的皮肤损伤的临床治疗提供新的思路。

关键词 内质网应激; 表皮; 角质形成细胞; 紫外线 B; 未折叠蛋白反应; 活性氧

中图分类号 R 758.1

文献标志码 A

Epidermal endoplasmic reticulum stress induced by UVB radiation and therapeutic interventions

Lin Boyang, Qiang Lei

(School of Basic Medicine and Clinical Pharmacy, China Pharmaceutical University,
Nanjing 211198)

2025-06-20 接收

基金项目: 国家自然科学基金项目 (编号: 81974425); 江苏省自然科学基金项目 (编号: BK20211578)

作者简介: 林博扬, 男, 硕士研究生;

强 磊, 男, 博士, 教授, 博士生导师, 通信作者, E-mail: lqiang@cpu.edu.cn

Abstract The endoplasmic reticulum is one of the most prominent membranous organelles that plays a significant role in maintaining intracellular homeostasis. Specific internal or external stimulus leading to the accumulation of unfolded or misfolded proteins, alteration in intracellular calcium levels, or disruptions in redox homeostasis will trigger ER dysfunction and, ultimately, endoplasmic reticulum stress (ERS). Physiologically, ERS is involved in maintaining the homeostasis of the epidermal skin barrier. Ultraviolet B (UVB) induces epidermal ERS, following the activation of a variety of physiological and pathological processes. It participates in the physiological processes of epidermal barrier homeostasis and keratinocyte differentiation, and also contributes to pathological processes such as UVB-induced skin inflammation and keratinocyte apoptosis leading to skin damage. Therefore, ERS is expected to become a therapeutic target for UVB-mediated skin-related diseases. Currently, the clinical potential of modulating UVB-induced keratinocyte ERS through the use of antioxidants, NF- κ B inhibitors, and ER Ca^{2+} regulators has been increasingly recognized. This review focuses on the mechanisms underlying UVB-induced skin damage, the molecular mechanisms of UVB-induced keratinocyte ERS, and the current progress of ERS-targeting drugs in UVB-induced skin damage, providing new insights into ERS's roles in UVB-induced skin damage and novel therapeutic strategies targeting ERS for the clinical treatment of UVB-induced skin damage.

Key words endoplasmic reticulum stress; epidermis; keratinocyte; ultraviolet B; unfolded protein response; reactive oxygen species

Fund programs National Natural Science Foundation of China (No. 81974425); Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. BK20211578)

Corresponding author Qiang Lei, E-mail: lqiang@cpu.edu.cn

皮肤是人体最大的器官,可分为表皮、真皮和皮下组织。表皮主要由角质形成细胞构成,其通过紧密连接 (epidermal tight junction, TJ) 和有序的逐级分化构成皮肤物理屏障^[1]。紫外线可按照波长被分为长波紫外线 (ultraviolet A, UVA) (320~400 nm), 中波紫外线 (ultraviolet B, UVB) (280~320 nm) 和短波紫外线 (ultraviolet C, UVC) (100~280 nm)。其中, UVC 能够完全被臭氧层吸收,无法对皮肤产生损伤; UVA 可深入真皮诱导皮肤衰老和色素沉积^[2]。而 UVB 被称为“灼烧射线”,相比 UVA,它具有更高能量和更大危害。角质形成

细胞通过激活一系列响应维持细胞内环境稳态，防止其凋亡、坏死，进而减弱皮肤局部炎症反应。针对 UVB 诱导的皮肤损伤的防治策略仍较局限：防晒霜的应用是最主要的预防措施；利用抗氧化剂（如维生素 E、姜黄素等）中和活性氧 (reactive oxygen species, ROS)，减少氧化损伤，或利用 DNA 修复酶（如 T4N5 脂质体）乳霜减少细胞突变风险，抑或利用局部抗炎药物（如糖皮质激素）治疗严重紫外线过敏为目前常见的损伤后治疗策略。深入研究 UVB 诱导的皮肤损伤发病机制，将为 UVB 诱导皮肤损伤的防治奠定坚实的理论基础。

在 UVB 诱导的皮肤损伤中，内质网应激 (endoplasmic reticulum stress, ERS) 是重要一环，与其他生物学过程间的系统性调控共同塑造了该疾病的病理学图景。随着对 UVB 诱导的 ERS 的深入研究，ERS 有望成为 UVB 诱导的皮肤损伤潜在的治疗靶点。围绕 UVB 诱导皮肤损伤的机制、UVB 诱导的 ERS 及针对 ERS 通路治疗 UVB 诱导的皮肤损伤药物的研究进展进行综述，有助于揭示 ERS 在 UVB 诱导的皮肤损伤中的干预价值，为开发 UVB 诱导皮肤损伤的防治药物提供新的研究方向。

1 UVB 诱导皮肤损伤的机制

UVB 诱导的皮肤损伤可分为急性损伤和慢性损伤。在急性损伤中，最常见的病理表型是晒伤，包含皮肤疼痛、红斑、水肿、水疱、对热敏感等急性反应，这些临床表现与活性氧生成和免疫系统激活密切相关。慢性损伤包括日光性角化 (actinic keratosis, AK) 和光老化。AK 的临床表现是鳞状或角化性斑疹或丘疹，为鳞状细胞癌的一种常见的癌前期病变；光老化被定义为皮肤持续受到紫外线照射所产生的衰老性改变，其表现为皱纹、色素沉着改变和肤色丧失。

1.1 UVB 对皮肤细胞的病理学影响 在细胞病理学层面，UVB 促进角质形成细胞增殖分化^[3]、促进细胞骨架蛋白表达、破坏微管或改变其组织形式^[4]、诱导其自噬水平上调^[5]和发生包括自噬性细胞死亡、凋亡、焦亡、坏死性凋亡的程序性细胞死亡 (programmed cell death, PCD)^[6]。UVB 能够诱导成纤维细胞衰老，促进了皮肤整体的光老化进展^[7]；同时，在 UVB 刺激下，成纤维细胞通过分泌相关细胞因子促进角质形成细胞存活、DNA 修复进程^[8]。UVB 能够激活黑素细胞以促进其黑色素合成^[9]，促进曝光区和非曝光区的黑素细胞增殖和迁移^[10]。但如果黑素细胞的正常细胞周期调控机制遭到 UVB 破坏，将导致其异常增殖，进而诱导不典型色素痣发生。

UVB 对皮肤免疫细胞浸润存在复杂的调节。UVB 诱导 T 细胞、中性粒细胞、促炎型即 M1 型巨噬细胞向曝光部位募集^[11]、降低朗格汉斯细胞浸润及其活力，但单核细胞及单核细胞来源的树突状细胞的募集则受到促进，进而弥补朗格汉斯细胞在皮肤的缺失^[12]。

1.2 UVB 诱导皮肤损伤的分子机制 UVB 通过多种分子机制加剧了表皮细胞的损伤。UVB 下调叶酸水平^[13], 进而抑制了 DNA 甲基转移酶对 DNA 的甲基化; 同时, 组蛋白的翻译后修饰也同样受到 UVB 影响, 两者最终加剧了 UVB 诱导的光老化、提高癌症发生概率^[14]。基质金属蛋白酶 (matrix metalloproteinases, MMPs) 表达的上调是 UVB 诱导皮肤损伤的另一重要方面^[15]。

氧化应激是 UVB 诱导的皮肤损伤中最关键的因素。在 UVB 照射后, 电离辐射增加细胞内超氧阴离子自由基 (O_2^-) 和过氧化氢(H_2O_2) 水平, 进而产生大量的 ROS。但 UVB 直接产生的 ROS 较少, 更多由诱导产生。UVB 诱导产生的 ROS 生成可以分为两个阶段^[16]: 在 UVB 照射后短时间内, ROS 主要由 NADPH 氧化酶 (NADPH oxidase, NOX) 和环氧合酶 (cyclooxygenase, COX) 催化生成^[17], 在 30 min 内达到峰值, 且在 1 h 后回归基线水平^[16]; 而在 UVB 照射后 3 h 至 6 h, ROS 能够再次上升, 相比第 1 次上升峰值更低但持续时间更长, 且可能与线粒体功能障碍相关^[18], 过表达过氧化氢酶能够逆转此次上升^[16]。另外, 也有文章指出在 UVB 照射较长一段时间后 (> 24 h) 活性氮 (reactive nitrogen species, RNS) 占据主导作用而非 ROS^[19]。环丁烷嘧啶二聚体 (cyclobutane pyrimidine dimers, CPD) 和嘧啶-(6-4)-嘧啶酮光产物 [pyrimidine-(6-4)-pyrimidone photoproducts, 6-4PP] 是 UVB 诱导的 DNA 损伤的典型形式, 由 UVB 直接诱导形成; 而 8-羟基-2'-脱氧鸟苷 (8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, 8-OHdG) 是自由基诱导的 DNA 损伤的主要形式^[20]。DNA 氧化损伤积累且未能在进入细胞周期前通过修复途径及时修复, 将使细胞携带特定基因如 TP53、CDKN2A 等的突变, 进而使细胞恶性转化, 促进黑色素瘤和非黑色素瘤的发生^[6,9,14]。

1.3 UVB 诱导的炎症反应 ROS 诱导多种促炎细胞因子和趋化因子, 如肿瘤坏死因子 α (tumor necrosis factor α , TNF- α)、干扰素- γ (interferon- γ , IFN- γ)、白介素 (interleukin, IL)-1、IL-8 以及前列腺素 E2 (prostaglandin E2, PGE2) 在角质形成细胞的持续表达和分泌, 进而导致免疫细胞如中性粒细胞、巨噬细胞等向光暴露部位聚集^[21-22]。中性粒细胞通过形成中性粒细胞胞外陷阱 (neutrophil extracellular traps, NETs) 释放更多的 ROS、弹性蛋白酶和髓过氧化物酶来加重皮肤损伤^[23]; 而巨噬细胞通过经典途径激活转变为 M1 型巨噬细胞后, 也能够通过进一步分泌细胞因子和趋化因子诱导持续的炎症反应^[24]。UVB 诱导的皮肤炎症微环境最终导致血管扩张和血管通透性增强、液体渗出进入周围组织, 最终表现为皮肤红斑和水肿。

2 UVB 诱导的 ERS

当内质网向高尔基体的转运受到抑制, 或是蛋白质合成压力增加而新生蛋白因多种因素不能正常折叠或转运, 错误折叠、未折叠蛋白在内质网中聚集, 将导致 ERS^[25]。生理状态

下, ERS 水平随着角质形成细胞分化水平增加而增加^[26], 环境剂量 UVB 激活的 ERS 维持 TJ 完整性^[1]、促进抗菌肽合成的同时巩固皮肤渗透性屏障^[27]; 病理状态下, 高剂量的 UVB 诱导 ERS 的过度激活, 将诱导细胞凋亡^[6]、同时 ERS 激活下游的 NF- κ B 信号通路, 将进一步诱导角质形成细胞的促炎因子表达、分泌, 加重皮肤炎症反应^[28]。

ERS 发生后, 细胞通过激活未折叠蛋白反应 (unfolded protein response, UPR) 来恢复内质网的稳态。UPR 通过三大压力响应蛋白: 蛋白激酶 R 样内质网激酶 (PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, PERK)、肌醇依赖酶 1 (inositol-requiring protein 1, IRE1)、转录激活因子 6 (activating transcription factor 6, ATF6) 及其下游通路的激活调控转录、翻译、转运与蛋白质降解以缓解 ERS 水平^[25]。ERS 参与多种皮肤疾病, 如毛囊角化病、变异性红斑角化病 (erythrokeratoderma variabilis, EKV)、银屑病、红斑痤疮等疾病的发生发展^[29]。

2.1 UVB 诱导的 ERS 的分子机制 在 UVB 诱导的皮肤损伤中, ERS 不仅与氧化应激密切相关, 还涉及 Ca^{2+} 的外流。ROS、RNS 介导细胞氧化应激, 能够破坏内质网的脂质双分子结构, 引起内质网结构破坏; 同时两者也能与内质网中新生蛋白游离的-SH 发生反应, 或是耗竭内质网中谷胱甘肽, 使新生蛋白不能被正确折叠, 进而发生 ERS、诱导 UPR 通路激活; 氧化应激还能进一步介导 Ca^{2+} 从内质网的释放, 此效应为 UVB 诱导的 ERS 的主要推动力量。 Ca^{2+} 对内质网新生蛋白折叠起至关重要的作用, 内质网中的 Ca^{2+} 受到 Ca^{2+} 转运体、离子通道、钠钙交换体、 Ca^{2+} 结合/缓冲蛋白和 Ca^{2+} 泵的严密调控以维持其水平稳定^[30]; Ca^{2+} 稳态对于内质网行使其蛋白合成、折叠、翻译后修饰和转运功能至关重要, 同时 Ca^{2+} 不仅通过密切调控多种分子伴侣如钙调蛋白、葡萄糖调节蛋白 94 (94 ku glucose-regulated protein, GRP94)、免疫球蛋白结合蛋白 (binding-immunoglobulin protein, BiP) 对 ERS 起间接调控作用, 同时分子伴侣作为稳定的 Ca^{2+} 缓冲蛋白存在于内质网中^[31]。 Ca^{2+} 还能与蛋白质二硫键异构酶 (protein disulfide isomerase, PDI) 结合支持其与新生肽链结合、促进新生肽链的正确折叠^[30]。 Ca^{2+} 还可作为第二信使调控基因表达、细胞周期进程、代谢, 从而以更大的维度对内质网稳态发生调控作用^[32]。UVB 诱导的氧化应激能够促进 Ca^{2+} 从内质网释放, 诱导 ERS, 这与内质网内氧化还原状态发生改变, 使 Ca^{2+} 泵和离子通道功能受损相关^[33]。这些效应共同诱导 PERK-CHOP 通路的激活, 导致细胞发生 ERS 依赖的凋亡^[6]。

2.2 ERS 与炎症反应 炎症反应诱导的 ERS 大多为 ROS 升高依赖的 ERS^[34]。目前尚无文献描述促炎因子是否能够诱导角质形成细胞发生 ERS, 但促炎因子对 ERS 存在切实调控的证据已在非皮肤的疾病模型中得到研究。TNF- α 被发现在小鼠纤维肉瘤细胞系 L929 中以 ROS 依赖的形式激活 ERS、诱导其发生凋亡^[35]。而在人气道平滑肌的研究中, 有研究^[36]表明 TNF- α

诱导超氧化物生成,进而诱导 IRE1 α 磷酸化激活,而超氧化物中和剂 Tempol 能够抑制此过程。鉴于 IFN- γ 被发现能够诱导角质形成细胞的 ROS 生成^[37]、募集到皮肤的 T 细胞所分泌的 TNF- α 和 IFN- γ 能够诱导角质形成细胞表达诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase, iNOS),同时促进其活性,进而促进 RNS 生成^[38],那么 UVB 所诱导的炎症反应可能能够通过促炎细胞因子如 TNF- α 和 IFN- γ 及其下游通路激活,使细胞内 ROS 与 RNS 进一步生成,进而诱导更大范围或更长时程的 ERS,这需要进一步的研究加以证实。

3 针对 ERS 的治疗 UVB 诱导的皮肤损伤的药物研究进展

3.1 抗氧化剂 利用抗氧化剂消耗过度产生的 ROS,是治疗 UVB 诱导的皮肤损伤的普遍策略,抗氧化剂的引入减弱了 ROS 对内质网稳态的破坏。扇贝多肽是由栉孔扇贝内脏团制备的水溶性小分子抗氧化多肽。其能以剂量依赖的形式耗竭 UVB 诱导产生的 ROS、恢复内质网的氧化还原稳态,进而抑制 UVB 诱导的 ERS 和 CHOP 介导的凋亡^[39]。与此类似的是,长果锥提取物被发现同样具有抗氧化作用进而耗竭 ROS、抑制 UVB 诱导 ERS 和下游的凋亡^[40]。银杏提取物 (*Ginkgo biloba* L. extract, GBE) 同样被发现具有抗氧化作用^[41],同时 NF- κ B 抑制剂吡咯烷二硫代甲酸铵 (pyrrolidine dithiocarbamate, PDTC) 也能通过抑制 NF- κ B/iNOS 信号通路减弱细胞氧化应激水平^[42]。在 UVB 诱导角质形成细胞 ERS 后联合给药 GBE 与 PDTC,发现联合给药相比单用其中一药具有更好的 ERS 缓解和皮肤光损伤保护作用^[43]。富含花青素的木槿多酚提取物也被发现能够对 UVB 照射导致的表皮损伤起保护作用。除了此提取物的还原效应外,其被发现能够减弱 UVB 照射后角质形成细胞的线粒体膜电位去极化、降低线粒体的 ROS 生成,进而减弱细胞 ERS 水平^[44]。

3.2 其他药物 人参提取物由多种天然活性组分组成,其中含量最高的是人参皂苷 Rg3^[45]。有研究^[46]表明,Rg3 能够通过调控小泛素相关修饰物 1 (small ubiquitin-related modifier 1,SUMO1) 进而显著增强钙离子转运蛋白心肌肌浆网 Ca²⁺-ATP 酶 (sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2) SUMO 化水平,进而恢复主动脉弓缩窄 (transverse aortic constriction, TAC) 下心肌肌浆网 Ca²⁺水平。角质形成细胞在受到 UVB 刺激后,内质网 Ca²⁺浓度调控蛋白,液泡膜蛋白 1 (vacuole membrane protein 1, VMP1) 显著下调,而人参提取物以剂量依赖的形式逆转此下调,进而抑制 UVB 诱导的内质网 Ca²⁺外流、缓解 UVB 诱导的 ERS。

另有香芹酚 (carvacrol, CRV) 被发现能够在体外实验中减弱 UVA 与 UVB 联合诱导的皮肤 ERS 水平,但其发挥作用的具体分子机制并无进一步研究^[47]。

4 展望

UVB 诱导的角质形成细胞 ERS 是 UVB 诱导皮肤损伤中的重要环节, 此过程受到多种因素、多种细胞内过程如氧化应激、 Ca^{2+} 作为第二信使的信号传导等的系统性调控, 同时也影响表皮的各种生理病理学过程如皮肤屏障、表皮分化、炎症反应等。随着对 UVB 诱导的角质形成细胞 ERS 的系统性研究不断深入, ERS 与其他细胞生物学过程或生理病理学过程的相互作用将被更好地揭示; 以 UVB 诱导的 ERS 作为干预方向, 也为治疗 UVB 诱导的皮肤损伤指出了一个值得进一步研究的研究方向。因此, 在未来的研究中仍需依托分子机制的进一步研究, 探索新型的、干预 UVB 诱导 ERS 的药物。

参考文献

- [1] Seo S H, Kim S E, Lee S E. ER stress induced by ER calcium depletion and UVB irradiation regulates tight junction barrier integrity in human keratinocytes[J]. *J Dermatol Sci*, 2020, 98(1): 41-9. doi:10.1016/j.jdermsci.2020.02.006.
- [2] Battie C, Jitsukawa S, Bernerd F, et al. New insights in photoaging, UVA induced damage and skin types[J]. *Exp Dermatol*, 2014, 23(s1): 7-12. doi:10.1111/exd.12388.
- [3] Lee J H, An H T, Chung J H, et al. Acute effects of UVB radiation on the proliferation and differentiation of keratinocytes[J]. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, 2002, 18(5): 253-61. doi:10.1034/j.1600-0781.2002.02755.x.
- [4] Misovic M, Milenkovic D, Martinovic T, et al. Short-term exposure to UV-A, UV-B, and UV-C irradiation induces alteration in cytoskeleton and autophagy in human keratinocytes[J]. *Ultrastruct Pathol*, 2013, 37(4): 241-8. doi:10.3109/01913123.2012.756568.
- [5] Sample A, He Y Y. Autophagy in UV damage response[J]. *Photochem Photobiol*, 2017, 93(4): 943-55. doi:10.1111/php.12691.
- [6] Tang Z, Tong X, Huang J, et al. Research progress of keratinocyte-programmed cell death in UV-induced Skin photodamage[J]. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, 2021, 37(5): 442-8. doi:10.1111/php.12679.
- [7] Cavinato M, Jansen-Dürr P. Molecular mechanisms of UVB-induced senescence of dermal fibroblasts and its relevance for photoaging of the human skin[J]. *Exp Gerontol*, 2017, 94: 78-82. doi:10.1016/j.exger.2017.01.009.
- [8] Fernandez T L, Van Lonkhuyzen D R, Dawson R A, et al. *In vitro* investigations on the effect of dermal fibroblasts on keratinocyte responses to ultraviolet B radiation[J]. *Photochem Photobiol*, 2014, 90(6): 1332-9. doi:10.1111/php.12317.
- [9] De Fabo E C, Noonan F P, Fears T, et al. Ultraviolet B but not ultraviolet A radiation initiates melanoma[J]. *Cancer Res*, 2004, 64(18): 6372-6. doi:10.1158/0008-5472.CAN-04-1454.
- [10] Stiermer U, Rosdahl I, Augustsson A, et al. UVB irradiation induces melanocyte increase in both exposed and shielded human skin[J]. *J Invest Dermatol*, 1989, 92(4): 561-4. doi:10.1111/1523-1747.ep12709572.
- [11] Cooper K D, Duraiswamy N, Hammerberg C, et al. Neutrophils, differentiated macrophages, and monocyte/macrophage antigen presenting cells infiltrate murine epidermis after UV injury[J]. *J Invest Dermatol*, 1993, 101(2): 155-63. doi:10.1111/1523-1747.ep12363639.
- [12] Achachi A, Vocanson M, Bastien P, et al. UV radiation induces the epidermal recruitment of

dendritic cells that compensate for the depletion of Langerhans cells in human skin[J]. *J Invest Dermatol*, 2015, 135(8): 2058-67. doi:10.1038/jid.2015.118.

[13] Cicarma E, Mørk C, Porojnicu A C, et al. Influence of narrowband UVB phototherapy on vitamin D and folate status[J]. *Exp Dermatol*, 2010, 19(8): e67-72. doi:10.1111/j.1600-0625.2009.00987.x.

[14] Barnes B M, Shyne A, Gunn D A, et al. Epigenetics and ultraviolet radiation: implications for skin ageing and carcinogenesis[J]. *Skin Health Dis*, 2024, 4(6): e410. doi:10.1002/ski2.410.

[15] Brenneisen P, Sies H, Scharffetter-Kochanek K. Ultraviolet-B irradiation and matrix metalloproteinases: from induction *via* signaling to initial events[J]. *Ann N Y Acad Sci*, 2002, 973: 31-43. doi:10.1111/j.1749-6632.2002.tb04602.x.

[16] Rezvani H R, Mazurier F, Cario-André M, et al. Protective effects of catalase overexpression on UVB-induced apoptosis in normal human keratinocytes[J]. *J Biol Chem*, 2006, 281(26): 17999-8007. doi:10.1074/jbc.M600536200.

[17] Beak S M, Lee Y S, Kim J A. NADPH oxidase and cyclooxygenase mediate the ultraviolet B-induced generation of reactive oxygen species and activation of nuclear factor-kappaB in HaCaT human keratinocytes[J]. *Biochimie*, 2004, 86(7): 425-9. doi:10.1016/j.biochi.2004.06.010.

[18] Paz M L, González Maglio D H, Weill F S, et al. Mitochondrial dysfunction and cellular stress progression after ultraviolet B irradiation in human keratinocytes[J]. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, 2008, 24(3): 115-22. doi:10.1111/j.1600-0781.2008.00348.x.

[19] Terra V A, Souza-Neto F P, Pereira R C, et al. Time-dependent reactive species formation and oxidative stress damage in the skin after UVB irradiation[J]. *J Photochem Photobiol B Biol*, 2012, 109: 34-41. doi:10.1016/j.jphotobiol.2012.01.003.

[20] Ahmed N U, Ueda M, Nikaido O, et al. High levels of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine appear in normal human epidermis after a single dose of ultraviolet radiation[J]. *Br J Dermatol*, 1999, 140(2): 226-31. doi:10.1111/j.1365-2133.1999.02653.x.

[21] Kabashima K, Nagamachi M, Honda T, et al. Prostaglandin E2 is required for ultraviolet B-induced skin inflammation *via* EP2 and EP4 receptors[J]. *Lab Invest*, 2007, 87(1): 49-55. doi:10.1038/labinvest.3700491.

[22] Strickland I, Rhodes L E, Flanagan B F, et al. TNF-alpha and IL-8 are upregulated in the epidermis of normal human skin after UVB exposure: correlation with neutrophil accumulation and E-selectin expression[J]. *J Invest Dermatol*, 1997, 108(5): 763-8. doi:10.1111/1523-1747.ep12292156.

[23] Zawrotniak M, Bartnicka D, Rapala-Kozik M. UVA and UVB radiation induce the formation of neutrophil extracellular traps by human polymorphonuclear cells[J]. *J Photochem Photobiol B*, 2019, 196: 111511. doi:10.1016/j.jphotobiol.2019.111511.

[24] Karisola P, Nikkola V, Joronen H, et al. Narrow-band UVB radiation triggers diverse changes in the gene expression and induces the accumulation of M1 macrophages in human skin[J]. *J Photochem Photobiol B*, 2024, 253: 112887. doi:10.1016/j.jphotobiol.2024.112887.

[25] Cao S S, Kaufman R J. Unfolded protein response[J]. *Curr Biol*, 2012, 22(16): R622-6. doi:10.1016/j.cub.2012.07.004.

[26] Sugiura K, Muro Y, Futamura K, et al. The unfolded protein response is activated in differentiating epidermal keratinocytes[J]. *J Invest Dermatol*, 2009, 129(9): 2126-35. doi:10.1038/jid.2009.51.

[27] Hong S P, Kim M J, Jung M Y, et al. Biopositive effects of low-dose UVB on epidermis: coordinate upregulation of antimicrobial peptides and permeability barrier reinforcement[J]. *J Invest Dermatol*, 2008, 128(12): 2880-7. doi:10.1038/jid.2008.169.

[28] Zhang K, Kaufman R J. From endoplasmic-reticulum stress to the inflammatory response[J].

Nature, 2008, 454(7203): 455-62. doi:10.1038/nature07203.

[29] Park K, Lee S E, Shin K O, et al. Insights into the role of endoplasmic reticulum stress in skin function and associated diseases[J]. FEBS J, 2019, 286(2): 413-25. doi:10.1111/febs.14739.

[30] Krebs J, Agellon L B, Michalak M. Ca(2+) homeostasis and endoplasmic reticulum (ER) stress: an integrated view of calcium signaling[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2015, 460(1): 114-21. doi:10.1016/j.bbrc.2015.02.004.

[31] Prins D, Michalak M. Organellar calcium buffers[J]. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2011, 3(3): a004069. doi:10.1101/cshperspect.a004069.

[32] Coe H, Michalak M. Calcium binding chaperones of the endoplasmic reticulum[J]. Gen Physiol Biophys, 2009, 28 Spec No Focus: F96-103.

[33] Zima A V, Blatter L A. Redox regulation of cardiac calcium channels and transporters[J]. Cardiovasc Res, 2006, 71(2): 310-21. doi:10.1016/j.cardiores.2006.02.019.

[34] Adolph T E, Niederreiter L, Blumberg R S, et al. Endoplasmic reticulum stress and inflammation[J]. Dig Dis, 2012, 30(4): 341-6. doi:10.1159/000338121.

[35] Xue X, Piao J H, Nakajima A, et al. Tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) induces the unfolded protein response (UPR) in a reactive oxygen species (ROS)-dependent fashion, and the UPR counteracts ROS accumulation by TNFalpha[J]. J Biol Chem, 2005, 280(40): 33917-25. doi:10.1074/jbc.M505818200.

[36] Yap J, Chen X, Delmotte P, et al. TNF α selectively activates the IRE1 α /XBP1 endoplasmic reticulum stress pathway in human airway smooth muscle cells[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2020, 318(3): L483-93. doi:10.1152/ajplung.00212.2019.

[37] Qi X F, Teng Y C, Yoon Y S, et al. Reactive oxygen species are involved in the IFN- γ -stimulated production of Th2 chemokines in HaCaT keratinocytes[J]. J Cell Physiol, 2011, 226(1): 58-65. doi:10.1002/jcp.22303.

[38] Viard-Leveugle I, Gaide O, Jankovic D, et al. TNF- α and IFN- γ are potential inducers of Fas-mediated keratinocyte apoptosis through activation of inducible nitric oxide synthase in toxic epidermal necrolysis[J]. J Invest Dermatol, 2013, 133(2): 489-98. doi:10.1038/jid.2012.330.

[39] Xie J, Zhong F, Han Y, et al. Polypeptide from *Chlamys farreri* restores endoplasmic reticulum (ER) redox homeostasis, suppresses ER stress, and inhibits ER stress-induced apoptosis in ultraviolet B-irradiated HaCaT cells[J]. Am J Transl Res, 2015, 7(5): 959-66.

[40] Lee H R, Yang J H, Lee J H, et al. Protective effect of *Castanopsis sieboldii* extract against UVB-induced photodamage in keratinocytes[J]. Molecules, 2023, 28(6): 2842. doi:10.3390/molecules28062842.

[41] Zhang S, Yi X, Su X, et al. *Ginkgo biloba* extract protects human melanocytes from H(2) O(2)-induced oxidative stress by activating Nrf2[J]. J Cell Mol Med, 2019, 23(8): 5193-9. doi:10.1111/jcmm.14393.

[42] Wan D, Wu Q, Qu W, et al. Pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) inhibits DON-induced mitochondrial dysfunction and apoptosis via the NF- κ B/iNOS pathway[J]. Oxid Med Cell Longev, 2018, 2018: 1324173. doi:10.1155/2018/1324173.

[43] Xu F, Hou B L, Wang Y, et al. Combination of PDTC and GBE could better alleviate the damage to HaCaT cells caused by UVB[J]. Biomed Environ Sci, 2019, 32(10): 779-82. doi:10.3967/bes2019.097.

[44] Karunarathne W A H M, Molagoda I M N, Lee K T, et al. Protective effect of anthocyanin-enriched polyphenols from *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceae) against ultraviolet

B-induced damage[J]. *Antioxidants*, 2021, 10(4): 584. doi:10.3390/antiox10040584.

[45] Yu T, Tang Y, Zhang F, et al. Roles of ginsenosides in sepsis[J]. *J Ginseng Res*, 2023, 47(1): 1-8. doi:10.1016/j.jgr.2022.05.004.

[46] Liu Z, Bian X, Gao W, et al. Rg3 promotes the SUMOylation of SERCA2a and corrects cardiac dysfunction in heart failure[J]. *Pharmacol Res*, 2021, 172: 105843. doi:10.1016/j.phrs.2021.105843.

[47] Eyyapan G, Ozkol H, Uce Ozkol H, et al. The preventive effects of natural plant compound carvacrol against combined UVA and UVB-induced endoplasmic reticulum stress in skin damage of rats[J]. *Photochem Photobiol Sci*, 2024, 23(9): 1783-90. doi:10.1007/s43630-024-00631-5.

