



安徽医科大学学报
Acta Universitatis Medicinalis Anhui
ISSN 1000-1492, CN 34-1065/R

《安徽医科大学学报》网络首发论文

题目： 辅助生殖技术助孕与自然受孕双绒毛膜双胎妊娠结局比较
作者： 尹建才，赵子嫣，赵保静，于震，杨媛媛
收稿日期： 2026-02-26
网络首发日期： 2026-03-16
引用格式： 尹建才，赵子嫣，赵保静，于震，杨媛媛. 辅助生殖技术助孕与自然受孕双绒毛膜双胎妊娠结局比较[J/OL]. 安徽医科大学学报.
<https://link.cnki.net/urlid/34.1065.r.20260314.1425.014>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

辅助生殖技术助孕与自然受孕双绒毛膜双胎妊娠结局比较

尹建才^{1,2,3}, 赵子嫣^{1,2,3}, 赵保静^{1,2,3}, 于震^{1,2,3}, 杨媛媛^{1,2,3}

(¹安徽医科大学第一附属医院妇产科, 合肥 230032; ²国家卫生健康委配子及生殖道异常研究重点实验室, 合肥 230032; ³安徽省生育障碍与妇产疾病研究重点实验室, 合肥 230032)

摘要 目的 探讨辅助生殖技术(ART)助孕与自然受孕双绒毛膜双羊膜囊(DCDA)双胎的妊娠结局差异,为ART助孕DCDA双胎围产期管理提供依据。**方法** 回顾性分析在安徽医科大学第一附属医院产科分娩的549例DCDA双胎孕产妇的临床资料,根据受孕方式分为ART助孕组(423例)和自然受孕组(126例),比较两组孕产妇的一般资料、妊娠并发症及新生儿结局。**结果** 在一般资料方面,ART助孕组的年龄、流产次数、初产妇比例、高龄产妇比例和产后24h出血量高于自然受孕组,产次和瘢痕子宫比例低于自然受孕组($P < 0.05$)。在妊娠并发症方面,ART助孕组的妊娠期高血压疾病、胎盘粘连、产后出血的发生率以及子宫动脉上行支结扎术的应用率更高($P < 0.05$)。两组新生儿相关指标差异均无统计学意义。校正年龄、流产次数和分娩次数等混杂因素后,ART仍可增加妊娠期高血压疾病、胎盘粘连、产后出血的发生风险($P < 0.05$),但不会增加新生儿不良结局的风险($P > 0.05$)。进一步的孕周亚组分析显示,在晚期早产亚组中,ART相关的妊娠并发症风险依然增高($P < 0.05$);在晚期早产及足月亚组中,两组新生儿结局的无差异($P > 0.05$)。**结论** ART助孕DCDA双胎孕产妇妊娠期高血压疾病、胎盘粘连、产后出血的发生风险增加,临床应加强孕期血压及产后出血量的监测,针对性防控并发症,改善妊娠结局。

关键词 辅助生殖技术; 自然妊娠; 双胎妊娠; 妊娠结局; 胎盘粘连; 产后出血; 妊娠期高血压

中图分类号 R 714.7

文献标志码 A

Pregnancy outcomes in dichorionic twins: comparing assisted reproductive technology and spontaneous conception

Yin Jiancai^{1,2,3}, Zhao Ziyang^{1,2,3}, Zhao Baojing^{1,2,3}, Yu Zhen^{1,2,3}, Yang Yuanyuan^{1,2,3}

2026-02-26 接收

基金项目: 安徽省高校科研计划项目(编号: 2023AH040369); 安徽省临床医学研究转化专项项目(编号: 202204295107020018)

作者简介: 尹建才, 男, 硕士研究生;

杨媛媛, 女, 副教授, 主任医师, 博士生导师, 通信作者, E-mail: wlj69513@sina.com

(¹Department of Obstetrics and Gynecology, the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei, 230032; ²NHC Key Laboratory of Study on Abnormal Gametes and Reproductive Tract, Hefei, 230032; ³Anhui Provincial Key Laboratory of Fertility Disorders and Obstetric and Gynecological Diseases Research, Hefei 230032)

Abstract Objective To investigate the differences in pregnancy outcomes between dichorionic diamniotic (DCDA) twin pregnancies conceived via assisted reproductive technology (ART) and those from spontaneous conception, in order to provide evidence for the perinatal management of ART-conceived DCDA twins. **Methods** A retrospective analysis was conducted on the clinical data of 549 DCDA twin parturients who delivered at the Department of Obstetrics, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University. Based on the mode of conception, they were divided into ART group (423 cases) and spontaneous conception group (126 cases). The baseline characteristics, pregnancy complications and neonatal outcomes were compared between the two groups. **Results** Regarding baseline characteristics, the ART group had higher maternal age, number of previous abortions, proportions of primiparas, proportions of advanced maternal age and greater 24-hour postpartum blood loss, but lower parity and proportion of scarred uterus compared to the spontaneous conception group ($P < 0.05$). For pregnancy complications, the ART group exhibited higher incidences of hypertensive disorders of pregnancy, placental adhesion, postpartum hemorrhage and a higher application rate of uterine artery ascending branch ligation ($P < 0.05$). There were no statistically significant differences in neonatal-related indicators between the two groups ($P > 0.05$). After adjusting for confounding factors such as age, number of abortions and parities, ART remained an independent risk factor for hypertensive disorders of pregnancy, placental adhesion and postpartum hemorrhage ($P < 0.05$), while it did not increase the risk of adverse neonatal outcomes ($P > 0.05$). Further subgroup analysis by gestational age showed that in the late preterm subgroup, the risk of ART-related pregnancy complications remained elevated ($P < 0.05$). Additionally, neonatal outcomes showed no significant difference between the two groups in both the late preterm and term subgroups ($P > 0.05$). **Conclusion** ART increases the risk of hypertensive disorders of pregnancy, placental adhesion and postpartum hemorrhage in DCDA twin parturients. Clinically, enhanced monitoring of blood pressure during pregnancy and blood loss during delivery and postpartum, along with targeted prevention and management of these complications, are crucial for improving pregnancy outcomes.

Key words assisted reproductive technology; spontaneous pregnancy; twin pregnancy; pregnancy outcome; placental adhesion; postpartum hemorrhage; hypertensive disorders of pregnancy

Fund programs Natural Science Research Project of Anhui Educational Committee (No.2023AH040369); Clinical Medical Research Translational Project of Anhui Province (No.202204295107020018)

Corresponding author Yang Yuanyuan, E-mail: wlj69513@sina.com

近年来,我国与生育相关的人口结构面临显著变化。在生育率持续走低的同时,不孕不育发生率由2007年的12%升至2020年的18%,目前仍呈上升态势^[1]。加之生育政策的全面调整优化(如“二孩”、“三孩”政策相继实施)以及女性生育年龄普遍推迟(导致高龄产妇比例逐年攀升),共同促使通过辅助生殖技术(assisted reproductive technology, ART)助孕的孕产妇数量逐年增加^[2]。临床实践中,常倾向于移植多枚胚胎,这一做法提高了双胎妊娠比例。而双胎妊娠本身即属高危妊娠范畴,其母体并发症及围产儿不良结局的发生风险显著高于单胎妊娠。

ART助孕是否进一步增加双胎孕产妇不良围产结局风险,目前学术界尚未达成共识。该研究通过系统收集ART助孕与自然受孕双绒毛膜双羊膜囊(dichorionic diamniotic, DCDA)双胎孕产妇及其新生儿的临床资料,旨在科学比较两组母婴围产结局的差异。研究结果可为临床提供更精准的ART咨询依据,并为提升母婴健康水平提供理论支持。

1 资料与方法

1.1 病例资料

选取2022年5月—2025年5月在安徽医科大学第一附属医院产科分娩的549例DCDA双胎孕产妇为研究对象。根据受孕方式将其分为ART助孕组(423例)和自然受孕组(126例)。

纳入标准:①完成产检和活产分娩的DCDA双胎孕产妇;②分娩孕周 ≥ 28 周;③自然受孕或ART助孕妊娠,ART方式包括体外受精-胚胎移植、胞质内单精子注射、胚胎植入前遗传学诊断3种受孕方式;④临床相关资料完整。排除标准:①使用供卵、供精者;②由3胎及以上的多胎妊娠减胎至双胎妊娠者;③妊娠前合并严重的内外科疾病者;④双胎之一为死胎者;⑤临床相关资料不完整者。本研究经医院医学伦理委员会审批通过(PJ 2025-07-96),符合豁免知情同意的相关规定,已豁免患者知情同意。

1.2 研究方法

采用回顾性研究设计,比较ART助孕组与自然受孕组孕产妇妊娠期内的妊娠并发症发生情况及母婴妊娠结局。通过电子病历系统、电话回访等方式获取研究对象的围产期资料。主

要包括以下几个方面。① 基本资料：年龄、高龄产妇 (≥ 35 岁)、身高、体质量、孕前体质量指数 (body mass index, BMI)、孕期体质量增长、分娩孕周、孕产次、分娩方式、瘢痕子宫和产后出血量, 同时根据分娩孕周, 将研究对象进一步划分为早期早产 ($28^{+0} \sim 33^{+6}$)、晚期早产 ($34^{+0} \sim 36^{+6}$) 及足月 (≥ 37) 3组。② 妊娠期并发症: 妊娠期高血压 (hypertensive disorders of pregnancy, HDP)、妊娠期糖尿病 (gestational diabetes mellitus, GDM)、妊娠期肝内胆汁淤积症 (intrahepatic cholestasis of pregnancy, ICP)、前置胎盘、胎儿生长受限、双胎生长不一致、胎膜早破 (premature rupture of membranes, PROM)、胎盘粘连、产后出血以及产后出血的手术止血方法 (子宫球囊放置术、子宫捆绑术、双侧子宫动脉上行支结扎术)。③ 新生儿结局: 新生儿出生一般信息, 包括体质量、身长、头围; 新生儿并发症及结局, 早产、低出生体质量儿、新生儿窒息、呼吸窘迫综合征 (neonatal respiratory distress syndrome, NRDS)、湿肺、肺炎、高胆红素血症、新生儿畸形以及是否转入新生儿科。④ 根据分娩孕周进行亚组分析。考虑到亚组样本量差异, 其结果主要用于描述性参考和趋势观察, 主体结论仍基于整体人群及校正主要混杂因素的多因素 Logistic 回归分析。

1.3 统计学处理

采用 SPSS23.0 软件对数据进行统计分析。正态分布的定量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用 t 检验; 非正态分布的定量资料用 $M (P_{25}, P_{75})$ 表示, 组间比较采用 Mann-Whitney U 检验; 定性资料用 $n(\%)$ 表示, 组间比较采用 χ^2 检验。采用多因素 Logistic 回归模型, 对孕妇年龄、流产次数、孕产次等潜在的混杂因素进行调整后, 分析 ART 本身与妊娠期并发症及妊娠结局之间是否存在独立的关联关系。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组孕产妇病例资料比较

ART 助孕组的年龄高于自然受孕组 ($P < 0.001$); 流产次数高于自然受孕组 ($P = 0.007$); 产次少于自然受孕组 ($P < 0.001$); 24 h 出血量多于自然受孕组 ($P = 0.007$); 初产妇比例高于自然受孕组 ($P < 0.001$); 高龄孕产妇比例高于自然受孕组 ($P < 0.001$); 瘢痕子宫比例低于自然受孕组 ($P = 0.046$)。两组在孕期体质量增长、孕前 BMI、分娩孕周、剖宫产率和孕次差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 1。

表 1 两组孕产妇基本资料比较 [$M(P_{25}, P_{75}), n(\%)$]

Tab.1 Comparison of baseline characteristics between the two groups [$M(P_{25}, P_{75}), n(\%)$]

Item	Spontaneous conception	ART group	Z/ χ^2	P
------	------------------------	-----------	-------------	---

	group (n=126)	(n=423)	value	value
Maternal age (years)	29.0 (27.0,32.0)	32.0 (30.0,35.0)	-7.075	<0.001
Pre-pregnancy BMI (kg/m ²)	22.0 (20.2,24.2)	22.0 (20.2,24.7)	-0.369	0.712
Weight gain (kg)	15.0 (13.0,20.0)	15.0 (12.0,20.0)	-0.703	0.482
Gestational weeks	36.6 (35.3,37.3)	36.4 (35.1,37.1)	-1.379	0.168
Gestational weeks groups				
≥37	51 (40.5)	152 (35.9)	0.860	0.354
34 ⁺⁰ ~ 36 ⁺⁶	61 (48.4)	202 (47.8)	0.017	0.897
28 ⁺⁰ ~ 33 ⁺⁶	14 (11.1)	69 (16.3)	2.046	0.153
Primipara	88 (69.8)	360 (85.1)	15.069	<0.001
Advanced maternal age	8 (6.3)	119 (28.1)	25.907	<0.001
Gravidity	1.5 (1.0,3.0)	2.0 (1.0,3.0)	-1.097	0.273
Abortions	0.0 (0.0,1.0)	1.0 (0.0,1.0)	-2.706	0.007
Parity	1.0 (1.0,2.0)	1.0 (1.0,1.0)	-3.866	<0.001
Scarred uterus	14 (11.1)	25 (5.9)	3.979	0.046
Cesarean delivery	115 (91.3)	394 (93.1)	0.505	0.477
24-hour blood loss (mL)	577.5 (500.0,710.0)	640.0 (535.0,795.0)	-2.977	0.003

2.2 两组孕产妇妊娠并发症比较

ART 助孕组的 HDP 发生率高于自然受孕组 ($P=0.014$)；胎盘粘连发生率高于自然受孕组 ($P=0.006$)；产后出血发生率高于自然受孕组 ($P=0.001$)；产后出血的手术止血方法中双侧子宫动脉上行支结扎术 ($P=0.001$) 应用率高于自然受孕组。两组在 GDM、ICP、前置胎盘、胎儿生长受限、胎膜早破等方面差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。见表 2。

表 2 两组孕产妇妊娠合并症比较 [$M(P_{25}, P_{75}), n(\%)$]

Tab.2 Comparison of pregnancy complications between the two groups [$M(P_{25}, P_{75}), n(\%)$]

Item	Spontaneous conception group (n=126)	ART group (n=423)	χ^2 value	P value
HDP	15 (11.9)	92 (21.7)	5.996	0.014
GDM	33 (26.2)	117 (27.7)	0.106	0.745
ICP	7 (5.6)	22 (5.2)	0.024	0.876

Placenta previa	1 (0.8)	14 (3.3)	1.463*	0.227
Fetal growth restriction	2 (1.6)	8 (1.9)	0.050*	0.823
Discordant fetal growth	8 (6.3)	13 (3.1)	2.832	0.092
PROM	14 (11.1)	61 (14.4)	0.902	0.342
Placenta adhesion	6 (4.8)	58 (13.7)	7.551	0.006
Placental abruption	0 (0.0)	2 (0.4)	-	>0.999
Postpartum hemorrhage	3 (2.4)	53 (12.5)	10.916	0.001
Intrauterine balloon tamponade	2 (1.6)	25 (5.9)	3.880	0.050
B-Lynch suture	8 (6.3)	45 (10.6)	2.048	0.152
Ascending uterine artery ligation	1 (0.8)	39 (9.2)	10.204	0.001

注: -: analyzed by Fisher's exact test; *: chi-square value with continuity correction.

2.3 两组受孕方式新生儿结局比较

两组新生儿在一般资料、相关并发症及结局等方面比较, 差异无统计学意义。见表 3、表 4。

表 3 两组新生儿一般资料比较[M(P₂₅, P₇₅)]

Tab.3 Comparison of baseline characteristics of neonates between the two groups [M(P₂₅, P₇₅)]

Item	Spontaneous conception group (n=126)	ART group (n=423)	Z value	P value
Larger fetus weight (kg)	2.50 (2.25,2.75)	2.51 (2.21,2.75)	-0.161	0.872
Smaller fetus weight (kg)	2.39 (2.10,2.68)	2.47 (2.15,2.71)	-1.231	0.218
Larger fetus length (cm)	47.00 (45.00,48.00)	47.00 (45.00,48.00)	-1.000	0.318
Smaller fetus length (cm)	46.00 (44.75,48.00)	47.00 (45.00,48.00)	-0.509	0.611
Larger fetus head circumference (cm)	33.00 (32.00,34.00)	33.00 (32.00,34.00)	-0.621	0.535
Smaller fetus head circumference (cm)	33.00 (32.00,34.00)	33.00 (32.00,34.00)	-1.329	0.184

表 4 两组新生儿并发症及结局情况比较[n(%)]

Tab.4 Comparison of complications and outcomes of neonates between the two groups [n(%)]

Item	Spontaneous conception group (n=252)	ART group (n=846)	Z/χ ² value	P value
------	--------------------------------------	-------------------	------------------------	---------

Preterm infant	152 (60.3)	542 (64.1)	0.587	0.444
Low birth weight infant	112 (44.4)	379 (44.8)	0.010	0.921
Neonatal asphyxia	20 (7.9)	59 (7.0)	0.269	0.604
NRDS	12 (4.8)	47 (5.6)	0.241	0.624
Pathological jaundice	11 (4.4)	59 (7.0)	2.214	0.137
Neonatal pneumonia	5 (2.0)	11 (1.3)	0.632	0.426
Neonatal transient tachypnea	8 (3.2)	42 (5.0)	1.431	0.232
Transfer to neonatal department	91 (36.1)	331 (39.1)	0.746	0.388
Fetal malformation	4 (1.6)	4 (0.5)	1.971	0.160

2.4 多因素 Logistic 回归分析

采用多因素 Logistic 回归分析对年龄、产次、流产次数等混杂因素进行校正，结果显示 ART 仍会增加 HDP、胎盘粘连、产后出血的发生风险 ($P < 0.05$)，见表 5；但 ART 不会增加新生儿相关并发症以及不良妊娠结局的风险 ($P > 0.05$)，见表 6。

表 5 ART 与妊娠并发症关联性的多因素 logistics 回归分析

Tab.5 Multivariate logistic regression analysis of the association between ART and pregnancy complications

Item	β	Wald	Unadjusted			Adjusted		
			OR	95% CI	P value	OR	95% CI	P value
HDP	0.721	5.806	2.057	1.144 - 3.698	0.016	1.920	1.028 - 3.585	0.041
Placenta adhesion	1.156	6.857	3.178	1.338 - 7.551	0.009	3.256	1.310 - 8.088	0.011
Postpartum hemorrhage	1.770	8.633	5.873	1.803 - 19.131	0.003	4.946	1.467 - 16.671	0.010

表 6 ART 与新生儿并发症及结局关联性的多因素 logistics 回归分析

Tab.6 Multivariate logistic regression analysis of the association between ART and neonatal complications and outcomes

Item	β	Wald	Unadjusted			Adjusted		
			OR	95% CI	P value	OR	95% CI	P value
Preterm infant	0.160	1.172	1.173	0.879 - 1.566	0.279	1.251	0.911 - 1.719	0.167

Low birth weight infant	0.014	0.010	1.014	0.764 - 1.346	0.996	0.999	0.734 - 1.361	0.996
Neonatal asphyxia	-0.140	0.269	0.870	0.513 - 1.474	0.604	0.837	0.471 - 1.489	0.545
NRDS	0.163	0.240	1.176	0.614 - 2.254	0.624	0.922	0.460 - 1.848	0.819
Pathological jaundice	0.496	2.174	1.642	0.849 - 3.177	0.140	1.480	0.732 - 2.989	0.275
Neonatal pneumonia	0.466	1.407	1.593	0.738 - 3.439	0.235	0.586	0.179 - 1.924	0.379
Neonatal transient tachypnea	-0.430	0.623	0.651	0.224 - 1.891	0.430	0.586	0.179 - 1.924	0.379
Transfer to neonatal department	0.128	0.745	1.137	0.849 - 1.522	0.388	1.260	0.916 - 1.732	0.155
Fetal malformation	-1.222	2.957	0.295	0.073 - 1.186	0.085	0.239	0.048 - 1.193	0.081

2.5 不同孕周亚组妊娠并发症比较

在晚期早产组 ($n=263$) 中, ART 组妊娠期高血压疾病[60 (29.7%) vs 6 (9.8%), $P=0.002$]、胎盘粘连[27 (13.4%) vs 2 (3.3%), $P=0.027$]的发生率及子宫动脉上行支结扎术应用率[23 (8.7%) vs 0 (0.0%), $P=0.006$]仍显著高于自然受孕组。此外, ART 组产后出血发生率也呈现增高趋势[27 (11.4%) vs 2 (3.3%), $P=0.058$]。与整体人群的分析结论一致, 表明 ART 与特定并发症的关联具有稳健性。

2.6 不同孕周亚组新生儿并发症及结局比较

不同孕周亚组的新生儿并发症及结局比较分析显示, 在晚期早产及足月亚组中, ART 与自然受孕双胎的新生儿并发症及结局发生率差异均无统计学意义, 进一步支持了 ART 未增加 DCDA 双胎新生儿不良结局风险的总体结论。在早期早产亚组中, 因自然受孕组样本量及其有限 ($n=28$), 统计效能不足, 观察到的组间差异可能由偶然因素导致, 结果的稳定性和解释力有限。

3 讨论

自首例试管婴儿诞生以来, ART 已成为解决不孕问题的重要方法。ART 的临床应用显著提高了双胎妊娠发生率, 全球每年约有 160 万对双胎胎儿诞生^[3]。ART 是否会进一步增加双胎妊娠的风险, 目前仍存在争议。部分研究^[4]认为 ART 可能增加围产期相关风险, 也有观点^[5]指出差异源于混杂因素而非 ART 本身。因此, 本研究通过回顾性分析近 3 年内于安徽医科大学第一附属医院产科住院分娩的 DCDA 双胎孕产妇临床资料, 系统比较 ART 助孕组与自然受孕组的妊娠并发症及围产结局差异, 为临床优化 ART 双胎围产期管理提供参考。

本研究显示, ART 助孕组孕产妇平均年龄、流产次数、初产妇比例高于自然受孕组, 而其产次以及瘢痕子宫比例则低于自然受孕组。该差异与 ART 患者多伴有高龄、不孕病史等临床特征一致, 也与已有文献^[6]报道相符。高龄和多次流产史是不孕症发生的常见因素, 亦是

ART助孕的主要指征。而该群体生育困难导致产次较低，剖宫产手术史相应减少，因此瘢痕子宫比例相应减少。

本研究显示，ART助孕组孕产妇HDP的发生率高于自然受孕组，与多项已有研究^[7-8]结论一致。这可能是因为ART卵巢刺激导致的高雌激素状态引起血管内皮功能紊乱^[9]，同时胚胎操作可能影响胎盘滋养细胞的功能与侵袭能力，造成胎盘浅着床和灌注不足，进而通过抗血管生成因子释放激活相关系统引发血压升高^[10]。ART助孕组胎盘粘连的发生率高于自然受孕组，该结果与之前的报道^[11]相符。该现象是多因素共同作用的结果。首先，ART可能干扰子宫内膜的正常蜕膜化过程，导致蜕膜层变薄或功能缺陷^[12]；同时，体外培养环境及外源性激素刺激可能引起滋养层细胞侵袭性异常增强，使其更易突破蜕膜-肌层界面^[13]；加之ART人群常伴高龄、既往宫腔操作史等高危因素，进一步加剧子宫内膜损伤风险，最终促进胎盘粘连发生。在妊娠结局方面，ART助孕组产后出血发生率较高，与既往研究结果^[14]一致。可能因为ART相关操作损伤子宫内膜基底层，干扰蜕膜化过程，增加胎盘附着异常风险，且常合并妊娠期高血压疾病影响凝血功能，加之高龄、剖宫产率高等特点，均增加出血风险。因此，ART双胎孕产妇需积极采取产后出血预防措施，产后密切监测生命体征及出血量。

本研究发现与自然受孕相比，ART不会增加DCDA双胎新生儿不良结局的发生风险，这与多项研究结果^[15-16]一致。可能得益于ART妊娠接受更频繁缜密的产前检查，有助于早期处理潜在并发症，也印证了当前ART助孕的安全性。

亚组分析表明，晚期早产组中ART组HDP、胎盘粘连等并发症的发生风险依然增高，与整体分析结论一致，支持了ART是独立于孕周的母体风险因素。早期早产亚组因自然受孕组样本量过小，统计效能不足。本研究已通过组间均衡性比较证实两组孕周分布无差异，因此未将孕周纳入多因素Logistic回归模型以避免多重共线性，保证核心变量（ART）效应估计稳定。未来需开展大规模前瞻性研究，分层分析不同孕周区间 ART 的独立风险。

本研究优势在于纳入对象接受同质化管理，排除绒毛膜性影响，且通过多因素Logistic回归排除混杂因素干扰，数据真实性可靠。不足为未区分不同ART技术，且为单中心研究易产生选择性偏倚，后续需扩大样本量开展多中心研究，进一步明确ART与双胎围产结局的关系。

综上所述，本研究证实ART助孕增加DCDA双胎孕产妇HDP、胎盘粘连及产后出血的发生风险。临床应将ART双胎孕产妇作为高危人群进行管理，加强孕期监测、积极防治妊娠期高血压等并发症，尤其重视产后出血的一级预防和应急准备。建议严格掌握胚胎移植指征，推行个体化移植策略。未来仍需开展多中心前瞻性研究进一步明确ART对母胎结局的远期影

响，为优化助孕策略及围产期管理提供更强证据支持。

参考文献

- [1] Qiao J, Wang Y, Li X, et al. A Lancet Commission on 70 years of women' s reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health in China[J]. *Lancet*, 2021, 397(10293): 2497-536. doi:10.1016/S0140-6736(20)32708-2.
- [2] Lv H, Diao F, Du J, et al. Assisted reproductive technology and birth defects in a Chinese birth cohort study[J]. *Lancet Reg Health West Pac*, 2021, 7: 100090. doi:10.1016/j.lanwpc.2020.100090.
- [3] Monden C, Pison G, Smits J. Twin peaks: more twinning in humans than ever before[J]. *Hum Reprod*, 2021, 36(6): 1666-73. doi:10.1093/humrep/deab029.
- [4] Marleen S, Kodithuwakku W, Nandasena R, et al. Maternal and perinatal outcomes in twin pregnancies following assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis involving 802 462 pregnancies[J]. *Hum Reprod Update*, 2024, 30(3): 309-22. doi:10.1093/humupd/dmae002.
- [5] Perros P, Koutras A, Prokopakis I, et al. Comparing perinatal outcomes of assisted reproductive technology (ART)-induced vs. naturally conceived twin pregnancies[J]. *Cureus*, 2024, 16(9):e69842. doi:10.7759/cureus.69842.
- [6] Tai W, Hu L, Wen J. Maternal and neonatal outcomes after assisted reproductive technology: a retrospective cohort study in China[J]. *Front Med*, 2022, 9: 837762. doi:10.3389/fmed.2022.837762.
- [7] Chih H J, Elias F T S, Gaudet L, et al. Assisted reproductive technology and hypertensive disorders of pregnancy: systematic review and meta-analyses[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2021, 21(1): 449. doi:10.1186/s12884-021-03938-8.
- [8] Prats P, Zarragoitia J, Rodríguez M Á, et al. Outcome in a series of 1135 twin pregnancies: does the type of conception play a role?[J]. *AJOG Glob Rep*, 2022, 2(4): 100129. doi:10.1016/j.xagr.2022.100129.
- [9] Niazi E, Dumanski S M. Change of HeART: cardiovascular implications of assisted reproductive technology[J]. *CJC Open*, 2023, 6(2Part B): 142-52. doi:10.1016/j.cjco.2023.09.008.
- [10] Deng J, Zhao H J, Zhong Y, et al. H3K27me3-modulated Hofbauer cell BMP2 signalling enhancement compensates for shallow trophoblast invasion in preeclampsia[J]. *EBioMedicine*, 2023, 93: 104664. doi:10.1016/j.ebiom.2023.104664.

[11] Nagata C, Yang L, Yamamoto-Hanada K, et al. Complications and adverse outcomes in pregnancy and childbirth among women who conceived by assisted reproductive technologies: a nationwide birth cohort study of Japan environment and children' s study[J]. *BMC Pregnancy Childbirth*, 2019, 19(1):77. doi:10.1186/s12884-019-2213-y.

[12] Tian J, Zhang Z, Mei J, et al. Dysregulation of endometrial stromal serotonin homeostasis leading to abnormal phosphatidylcholine metabolism impairs decidualization in patients with recurrent implantation failure[J]. *Hum Reprod Open*, 2024, 2024(3): hoae042. doi:10.1093/hropen/hoae042.

[13] Ciarmela P. Nutrition in gynecologic disease[J]. *Nutrients*, 2022, 14(3): 707. doi:10.3390/nu14030707.

[14] Liu Z, Yu L, Kang X, et al. Association of assisted reproductive technology with adverse maternal outcome: a cohort study[J]. *Pak J Med Sci*, 2024, 41(1): 15-21. doi:10.12669/pjms.41.1.10845.

[15] 吴娟, 曹云霞. 248例辅助生殖技术后双胎妊娠结局[J]. *安徽医科大学学报*, 2006, 41(3): 341-3. doi:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2006.03.035.

Wu J, Cao Y X. The analysis on the clinical effects of the twin pregnancy after assistant reproductive technology[J]. *Acta Univ Med Anhui*, 2006, 41(3): 341-3. doi:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2006.03.035.

[16] Jiang F, Gao J, He J, et al. Obstetric outcomes for twins from different conception methods - A multicenter cross-sectional study from China[J]. *Acta Obstet Gynecol Scand*, 2021, 100(6): 1061-7. doi:10.1111/aogs.14116.